



**PIANO TERAPEUTICO AIFA  
PER PRESCRIZIONE S.S.N. DI INTERFERONI (ex Nota 32)**

(ultimo aggiornamento con Determinazione AIFA 6 novembre 2009 pubblicata sulla G.U.n.266 del 14/11/ 2009)

Ricovero ordinario  Day Hospital  Day surgery  Ambulatoriale

Centro prescrittore \_\_\_\_\_

Medico prescrittore (nome e cognome) \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Paziente (nome e cognome) \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ sesso M  F

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

Regione \_\_\_\_\_

AUSL di residenza \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

Medico di medicina Generale \_\_\_\_\_

**La prescrizione di interferoni è a carico del SSN per le seguenti condizioni cliniche:**

**Epatite cronica B:**

**Epatite cronica B HBV-DNA-positiva, con ipertransaminasemia**

Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa-2° peghilato; Interferone alfa naturale leucocitario\*

**Epatite cronica B-Delta (monoterapia)**

Principi attivi: Interferone alfa 2a ricombinante; Interferone alfa 2b ricombinante; Interferone alfa naturale leucocitario\*

\*nota: Interferone alfa naturale leucocitario è previsto solo in caso di intolleranza agli interferoni ricombinanti ( presenza di documentata intolleranza soggettiva o neutropenia o piastrinopenia con conta dei neutrofili persistentemente inferiori a 750/mmc e/o piastrine persistentemente inferiori a 50.000/mmc, che compaiano in corso di terapia con altri interferoni, e che ne impediscano la prosecuzione in presenza di risposta terapeutica)

### Epatite C:

- **in combinazione con ribavirina o in monoterapia se esistono controindicazioni alla ribavirina, trattamento dell'epatite cronica C in pazienti adulti con ipertransaminasemia e positività per HCV-RNA, inclusi pazienti con malattia epatica avanzata (cirrosi epatica compensata – Child A) e/o con infezione da HIV, mai trattati in precedenza con interferoni o in recidiva dopo precedente trattamento con interferoni**

Principi attivi: Interferone alfa-2a peghilato; Interferone alfa-2b peghilato; Interferone alfa 2a ricombinante; Interferone alfa 2b ricombinante

Nota: vi sono evidenze in letteratura di maggiore efficacia degli Interferoni peghilati rispetto agli interferoni ricombinanti

- **In combinazione con ribavirina o in monoterapia, se esistono controindicazioni alla ribavirina: trattamento dell'epatite cronica C, con ipertransaminasemia, in soggetti senza scompenso epatico, positivi per HCV-RNA sierico, mai trattati in precedenza con interferoni o in recidiva dopo precedente trattamento con interferoni**

Principio attivo: Interferone alfa-2a peghilato.

- **in combinazione con ribavirina o in ionoterapia, se esistono controindicazioni alla ribavirina: trattamento dell'epatite cronica C in pazienti che hanno fallito un precedente trattamento di combinazione con interferone alfa (peghilato o non peghilato) e ribavirina o la ionoterapia con interferone alfa.**

Principi attivi: Interferone alfa-2a peghilato; Interferone alfa-2b peghilato.

- **In combinazione con ribavirina o in monoterapia, se esistono controindicazioni alla ribavirina, trattamento dell'epatite cronica C in pazienti adulti con ipertransaminasemia e positività per HCV-RNA: da riservare a pazienti con problemi di intolleranza agli interferoni (presenza di documentata intolleranza soggettiva o neutropenia o piastrinopenia con conta dei neutrofili persistentemente inferiori a 750/mmc e/o piastrine persistentemente inferiori a 50.000/mmc, che compaiano in corso di terapia con altri interferoni, e che ne impediscano la prosecuzione in presenza di risposta terapeutica). **Non utilizzare nei pazienti non responders a precedenti cicli di trattamento con interferoni****

Principi attivi: Interferone alfa naturale leucocitario

**Altre patologie**

**leucemia a cellule capellute**

Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa naturale leucocitario\*

**leucemia mieloide cronica**

Principi attivi: Interferone alfa 2-a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa naturale leucocitario\*

**sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS o ad altre condizioni cliniche di immunodepressione**

Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa naturale leucocitario\*

**linfoma non Hodgkin follicolare**

Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa naturale leucocitario\*

**melanoma maligno**

Principi attivi: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa naturale leucocitario\*

**carcinoma renale avanzato**

Principio attivo: Interferone alfa-2a ricombinante; Interferone alfa naturale leucocitario\*

**linfoma cutaneo a cellule T**

Principio attivo: Interferone alfa-2a ricombinante;

**mieloma multiplo**

Principio attivo: Interferone alfa-2b ricombinante; Interferone alfa naturale leucocitario\*

**tumore carcinoide**

Principio attivo: Interferone alfa-2b ricombinante

**micosi fungoide**

Principio attivo: Interferone alfa naturale leucocitario.

- nota: da impiegare solo in caso di intolleranza agli interferoni ricombinanti (in presenza di documentata intolleranza soggettiva o neutropenia o piastrinopenia con conta dei neutrofili persistentemente inferiori a 750/mmc e/o piastrine persistentemente inferiori a 50.000/mmc, che compaiano in corso di terapia con altri interferoni, e che ne impediscano la prosecuzione in presenza di risposta terapeutica.
- 

**Farmaco prescritto**

Interferone alfa 2a ricombinate

Interferone alfa 2b ricombinate

Interferone alfa 2a peghilato

Interferone alfa 2b peghilato

Interferone alfa naturale leucocitario

Dose/die: \_\_\_\_\_

Durata prevista del trattamento: \_\_\_\_\_

Prima prescrizione

Prosecuzione della cura

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma del clinico prescrittore  
\_\_\_\_\_